

Variabes aléatoires

Rappels de théorie

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

- Une fonction $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est une *variable aléatoire réelle* (v.a.r.) si elle est *mesurable* (\mathcal{F} - \mathcal{B} -mesurable), c-à-d si pour tout borélien $B \subset \mathbb{R}$, l'image réciproque $X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}$ appartient à la tribu \mathcal{F} .
- Si Ω est un ensemble dénombrable et $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$, alors toute fonction $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est mesurable.
- Si $\Omega = \mathbb{R}$ et $X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors elle est mesurable.
- Si X est une variable aléatoire réelle, on définit sa *loi* par $\mathbb{P}\{X \in B\} = \mathbb{P}(X^{-1}(B))$ pour tout borélien $B \subset \mathbb{R}$.
- La *fonction de répartition* de X est définie par $F_X(t) = \mathbb{P}\{X \leq t\}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. On dit que F_X est *absolument continue* de densité f_X s'il existe une fonction $f_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, d'intégrale 1, telle que

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f_X(x) dx \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Dans ce cas, on dit que f_X est la *densité* de (la loi de) X .

- Si Ω est dénombrable, alors son *espérance* est définie par l'une ou l'autre des deux expressions équivalentes

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}\{X = x\} = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}).$$

Si Ω est infini, on demande que les séries convergent absolument. Pour une fonction $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on définit

$$\mathbb{E}(\varphi(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} \varphi(x) \mathbb{P}\{X = x\} = \sum_{\omega \in \Omega} \varphi(X(\omega)) \mathbb{P}(\{\omega\}),$$

toujours à condition que les séries convergent absolument.


- Si X admet la densité f_X et que $|x|f_X(x)$ est intégrable, on définit l'*espérance* de X par

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx.$$

On définit de manière analogue $\mathbb{E}(\varphi(X))$ pour toute fonction $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $|\varphi(x)|f_X(x)$ soit intégrable par l'intégrale de $\varphi(x)f_X(x)$.

- La *variance* de X est définie par $\text{Var}(X) = \mathbb{E}([X - \mathbb{E}(X)]^2)$. La variance existe si et seulement si $\mathbb{E}(X^2)$ existe, et alors elle est égale à $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$.

Lois discrètes usuelles

1. *Loi uniforme* sur $\{1, \dots, n\}$: $X \sim \mathcal{U}_{\{1, \dots, n\}}$, $n \in \mathbb{N}^*$.
 Définition de la loi : $\mathbb{P}\{X = k\} = \frac{1}{n}$ pour $k \in \{1, \dots, n\}$.
 $\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2}$, $\text{Var}(X) = \frac{n^2-1}{12}$, $\mathbb{E}(z^X) = \frac{z+\dots+z^n}{n} = \frac{z(1-z^n)}{n(1-z)}$.
 Exemple : résultat d'un dé non pipé ($n = 6$).
2. *Loi de Bernoulli* : $X \sim \mathcal{B}(1, p)$, $0 \leq p \leq 1$.
 Définition de la loi : $\mathbb{P}\{X = 1\} = p$, $\mathbb{P}\{X = 0\} = 1 - p$.
 $\mathbb{E}(X) = p$, $\text{Var}(X) = p(1 - p)$, $\mathbb{E}(z^X) = pz + 1 - p$.
 Exemples : expérience de Bernoulli avec probabilité de succès p .
 Obtenir un 6 en lançant un dé ($p = \frac{1}{6}$).
3. *Loi binomiale* : $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq p \leq 1$.
 Définition de la loi : $\mathbb{P}\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ pour $k \in \{0, \dots, n\}$.
 $\mathbb{E}(X) = np$, $\text{Var}(X) = np(1 - p)$, $\mathbb{E}(z^X) = (pz + 1 - p)^n$.
 Exemple : nombre de succès dans une expérience de Bernoulli de longueur n avec probabilité de succès p .
4. *Loi géométrique* : $X \sim \mathcal{G}(p)$, $0 \leq p \leq 1$.
 Définition de la loi : $\mathbb{P}\{X = k\} = p(1 - p)^{k-1}$ pour $k \in \mathbb{N}^*$.
 $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$, $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$, $\mathbb{E}(z^X) = \frac{pz}{1-(1-p)z}$.
 Exemple : premier succès dans une expérience de Bernoulli de longueur infinie avec probabilité de succès p .
 Propriété : $\mathbb{P}\{X > n + k | X > n\} = \mathbb{P}\{X > k\}$ (absence de mémoire ou Markov).
5. *Loi de Poisson* : $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $\lambda > 0$.
 Définition de la loi : $\mathbb{P}\{X = k\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ pour $k \in \mathbb{N}$.
 $\mathbb{E}(X) = \lambda$, $\text{Var}(X) = \lambda$, $\mathbb{E}(z^X) = e^{\lambda(z-1)}$.
 Propriétés : Limite de la loi $\mathcal{B}(n, p_n)$ avec $np_n \rightarrow \lambda$ pour $n \rightarrow \infty$.
 La somme de deux v.a.r. indépendantes de lois $\mathcal{P}(\lambda)$ et $\mathcal{P}(\mu)$ suit une loi $\mathcal{P}(\lambda + \mu)$.
6.  *Loi hypergéométrique* : $X \sim \mathcal{H}(N, n, K)$, $N \in \mathbb{N}$, $n, K \in \{0, \dots, N\}$.
 Définition de la loi : $\mathbb{P}\{X = k\} = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$
 pour $k \in \{\max\{0, n + K - N\}, \dots, \min\{n, K\}\}$.
 $\mathbb{E}(X) = n \frac{K}{N}$, $\text{Var}(X) = n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$,
 $\mathbb{E}(z^X)$ s'exprime à l'aide d'une fonction hypergéométrique.
 Exemple : nombre de succès lors de n tirages sans remise dans une urne avec N éléments dont K succès.

Lois à densité usuelles

1. *Loi uniforme* sur $[a, b]$: $X \sim \mathcal{U}_{[a,b]}$, $a < b \in \mathbb{R}$.
 Densité : $f_X(t) = \frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}(t)$.
 $\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}$, $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$, $\mathbb{E}(e^{itX}) = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}$.
 Exemple : aiguille de Buffon.
2. *Loi exponentielle* : $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, $\lambda > 0$.
 Densité : $f_X(t) = \lambda e^{-\lambda t} \mathbf{1}_{t>0}$.
 $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$, $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$, $\mathbb{E}(e^{itX}) = \frac{\lambda}{\lambda - it}$.
 Propriétés : $\mathbb{P}\{X > t\} = e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$.
 $\mathbb{P}\{X \geq t + s | X \geq t\} = \mathbb{P}\{X \geq s\}$ (absence de mémoire ou Markov).
3. *Loi normale ou gaussienne* : $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, $m \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$.
 Densité : $f_X(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(t-m)^2/(2\sigma^2)}$.
 $\mathbb{E}(X) = m$, $\text{Var}(X) = \sigma^2$, $\mathbb{E}(e^{itX}) = e^{imt - \sigma^2 t^2/2}$.
 Propriétés : Théorème Central Limite.
 Une somme de v.a.r. gaussiennes suit une loi gaussienne.
4. *Loi Gamma* : $X \sim \gamma(p, \lambda)$, $p > 0$, $\lambda > 0$.
 Densité : $f_X(t) = \frac{\lambda^p}{\Gamma(p)} t^{p-1} e^{-\lambda t} \mathbf{1}_{t>0}$.
 $\mathbb{E}(X) = \frac{p}{\lambda}$, $\text{Var}(X) = \frac{p}{\lambda^2}$, $\mathbb{E}(e^{itX}) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - it}\right)^p$.
 Propriété : Si $p \in \mathbb{N}^*$, loi de la somme de p v.a.r. indépendantes de loi $\mathcal{E}(\lambda)$.
5. *Loi du Chi-deux* : $X \sim \chi^2(n)$, $n \in \mathbb{N}^*$.
 Densité : $f_X(t) = \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} t^{n/2-1} e^{-t/2} \mathbf{1}_{t>0}$.
 $\mathbb{E}(X) = n$, $\text{Var}(X) = 2n$, $\mathbb{E}(e^{itX}) = (1 - 2it)^{-n/2}$.
 Propriétés : Loi de la somme des carrés de n v.a.r. indépendantes de loi $\mathcal{N}(0, 1)$.
 Théorèmes de Fisher (variance empirique) et de Pearson (test d'adéquation à une loi).
6. *Loi de Cauchy* :
 Densité : $f_X(t) = \frac{1}{\pi(1+t^2)}$.
 Pas d'espérance, pas de variance. $\mathbb{E}(e^{itX}) = e^{-|t|}$.
 Propriété : Une somme de v.a.r. de Cauchy suit une loi de Cauchy.
 🚫 Exemple : Lieu de passage d'un mouvement Brownien 2D par une droite.
7. *Loi de Pareto* :
 Densité : $f_X(t) = \frac{\alpha}{t^{\alpha+1}} \mathbf{1}_{t>1}$, $\alpha > 0$.
 $\mathbb{E}(X) = \frac{\alpha}{\alpha-1}$ si $\alpha > 1$, $\text{Var}(X) = \frac{\alpha}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)}$ si $\alpha > 2$,
 $\mathbb{E}(e^{itX}) = \alpha(-it)^\alpha \Gamma(-\alpha, -it)$.
 Exemple : modélise certains événements à "queues lourdes" (tremblements de terre).